



MEDICINA ESTETICA FACIAL

ACIDO POLILACTICO (SCULPTRA)

SCULPTRA es un implante intradérmico de ácido poliláctico que se utiliza para restaurar el volumen perdido para arrugas y defectos de contorno.

SCULPTRA se inyecta por vía subcutánea ó intradérmica profunda, y es especialmente apropiada para:

- Reemplazar el volumen perdido debido al envejecimiento
- Surcos y arrugas profundas
- Cicatrices
- Defectos de volumen
- Recuperar el contorno
- Recuperar la elasticidad del tejido. Flacidez.
- Lipoatrofia

El ácido poliláctico en **SCULPTRA** es:

- Biocompatible y biodegradable.
- Producción sintética , no es necesario una prueba de alergia.
- Ha sido utilizado en medicina desde hace 25 años.

Composición. El vial contiene:

- Ácido poli-L-láctico, carboximetilcelulosa sódica, manitol no pirógeno.

“Tratar, Esperar, Evaluar” es el principio básico para la administración de Sculptra. La cantidad de Sculptra a inyectar por tratamiento y el número de sesiones de tratamiento variarán por paciente.

Es importante **tratar** en búsqueda de una corrección limitada en cada sesión, **esperar** a que se produzca un engrosamiento dérmico gradual y, después, **evaluar** la necesidad de una corrección adicional transcurrido un mínimo de 2 semanas.

En un estudio clínico, los aumentos del espesor del espesor cutáneo medio en comparación con la situación basal persistieron durante un periodo de 2 años.

Efectos secundarios:

- enrojecimiento localizado en el punto de inyección
- equimosis
- edema leve, que generalmente desaparece en el plazo de 2 a 6 días.

Si se trabaja con cánula la aparición de enrojecimiento, hematomas y la inflamación son mucho menores.

- También se han descrito nódulos. La utilización de la técnica adecuada y el masajear la zona tratada para asegurar la distribución adecuada del producto puede evitar la aparición de nódulos.
- En raras ocasiones se describen abscesos, granuloma tardío, reacción alérgica, sobretrofia y atrofia cutánea .

Consejos de cuidado post-tratamiento. Recomendaciones para el cuidado posterior:

- Masajear la zona tratada dos veces al día(de 2 a 3 minutos) durante varios días ó según la indicación de su médico.
- Para disminuir la fricción , utilizar crema ó loción facial para el masaje.
- Dentro de las primeras 24 horas, después del tratamiento debería aplicarse una bolsa de hielo durante unos minutos, el tiempo necesario para ayudar a reducir la hinchazón. Asegúrese que el hielo se envuelve en una funda apropiada para evitar el contacto con la piel.
- Se puede aplicar maquillaje pocas horas después del tratamiento si no existen complicaciones.
- Evite el exceso solar y la exposición a rayos ultravioleta hasta que la hinchazón y enrojecimiento inicial hayan desaparecido.

Duración de tratamiento entre 1h-1h30minutos.

Número de sesiones inicialmente 3, espaciadas 1 mes.

Anestesia en pomada si se trabaja con aguja.

No requiere anestesia si se trabaja con cánula de punta roma.

Se recomienda 1 sesión de mantenimiento al año.

Duración del tratamiento 2 años.

Se puede realizar cualquier época del año.