



Dra. Marian Zalakain Mendizabal
Licenciada en Medicina y Cirugía por la U.P.V.
Colegiada Nº 5609

TOXINA BOTULINICA

Nuestro centro cuenta con más de 10 años de experiencia, **esta autorizado por sanidad y en constante mejora** con cursos de formación continuada para la correcta aplicación de la toxina botulínica.

El tratamiento con toxina botulínica es un **acto exclusivamente médico**, en el que la valoración y realización del tratamiento por un especialista es importantísimo para conseguir un buen resultado.

La **corrección de las arrugas faciales**, principalmente del **tercio superior de la cara**, con toxina botulínica es un tratamiento cómodo, con una duración de 20-30 minutos por sesión, se realiza de forma ambulatoria, no necesita anestesia ni preparativos previos. Para su aplicación se utilizan agujas muy finas, por lo que prácticamente es indolora, aparece un ligero enrojecimiento de la zona por el pinchazo, a veces aparece algún pequeño hematoma que se resuelve en pocos días. Después del tratamiento el paciente se puede reincorporar a su actividad diaria con normalidad.

Representa uno de los **tratamientos más demandados por los pacientes**, por ser un método sencillo y eficaz para el tratamiento de arrugas de expresión, principalmente del tercio superior de la cara, pudiendo ser completado el resultado con otros tratamientos como láseres ó implantes (rellenos), logrando una gran satisfacción en los pacientes

Vistabel, Azzalure y Bocouture son los nombres comerciales del preparado compuesto por Toxina Botulínica tipo A purificado, realiza una acción selectiva sobre las terminaciones colinérgicas periféricas, al ser inyectada en el músculo causa una disminución de la contracción controlada del mismo.


Indicación.

La inyección de toxina botulínica en medicina estética está indicada para el tratamiento temporal y reversible (no definitivo) de las arrugas faciales producidas por la hiperactividad muscular exagerada de diversas zonas:

- Arrugas de frente
- Arrugas del entrecejo
- Arrugas de la zona lateral del ojo (patas de gallo)
- Corrección de asimetrías de las cejas.

Se utilizan agujas muy finas, por lo que prácticamente es indolora, apareciendo un ligero enrojecimiento de la zona por el pinchazo, puede aparecer algún pequeño hematoma que se resuelve en pocos días. Después del tratamiento el paciente se puede reincorporar a su actividad diaria con normalidad..

El **efecto del tratamiento** aparece a los 2-3 días, siendo completo el resultado a los 8-10 días. La duración del tratamiento suele ser entre 3-6 meses, en algunos casos se prolonga el resultado hasta pasados los 9 meses, al término de los cuales se recupera el estado inicial.



Consejos para el tratamiento:

- No frotar la zona tratada durante las primeras horas, para que el medicamento suministrado no se desplace a zonas contiguas.
- No debe tumbarse, se debe mantener la cabeza erguida (dormir con doble almohada) y agacharse con la espalda recta durante las primeras 24-48 horas.
- No hacer ejercicio intenso las horas posteriores al tratamiento, además de evitar saunas y baños de vapor.
- No realizar el tratamiento ni en embarazadas ni en periodo de lactancia.
- No tomar medicamentos que tengan efecto anticoagulante como el ácido acetil salicílico (Aspirina, Adiro...)
- Se recomienda no consumir alimentos ó bebidas con efecto vasodilatador (comidas picantes, bebidas alcohólicas, café...)
- Debe realizarse el tratamiento por un profesional médico con experiencia y especialmente preparado para ello.
- Debe saber que el tratamiento con toxina botulínica tiene un efecto temporal sobre las arrugas faciales, consiguiendo efectos satisfactorios con un mínimo riesgo y a un precio muy asequible.

Duración de tratamiento: 20-30 minutos

Anestesia: tópica 20-30 minutos ,no siempre es necesaria.

Sin limitación para actividad diaria.

Se puede realizar todo el año.