

Dra. Marian Zalakain Mendizabal Licenciada en Medicina y Cirugía por la U.P.V. Colegiada Nº 5609

MEDICINA ESTÉTICA FACIAL

RELLENOS: SURCOS NASOGENIANO Y COMISURA BUCAL

POMULOS Y MEJILLAS LINEA MANDIBULAR

ZONA PERIOCULAR /SURCO DE LA OJERA

LABIOS NARIZ

CUELLO Y ESCOTE

MANOS

Surco nasogeniano y comisura bucal.

Principalmente para el surco nasogeniano y comisura bucal se utilizan ácidos hialurónicos reticulados. Se pueden completar los resultados con tratamiento facial con efecto tensor utilizando implantes, radiofrecuencia y/ó laser semiablativo.

Esta mejora se obtiene de forma rápida, sencilla, sin apenas molestias y de forma efectiva.

Pómulos y mejillas

En pómulos y mejillas se puede utilizar cualquiera de los implantes reabsorbibles. En pómulos es frecuente utilizar para dar volumen ácidos hialurónicos específicos de mayor densidad.

Se puede mejorar el resultado con peelings químicos, mesoterapias faciales, radiofrecuencia y/ó laser semiablativo.

Esta mejora se obtiene de forma rápida, sencilla, sin apenas molestias y de forma efectiva.



Linea mandibular

La línea mandibular ó la perdida del óvalo facial requiere utilizar implantes principalmente con efecto tensor además de combinar tratamientos para la flacidez, como mesoterapias y radiofrecuencias.

Esta mejora se obtiene de forma rápida, sencilla, sin apenas molestias y de forma efectiva.

Zona periocular

En la zona periocular se recomienda corregir, inicialmente, las arrugas de expresión, con tóxina botulinica y posteriormente, si la arruga sigue siendo visible se rellena con ácidos hialurónicos de baja reticulación. También se puede combinar con peelings, mesoterapias, radiofrecuencias y láser semiablativo.

Esta mejora se obtiene de forma rápida, sencilla, sin apenas molestias y de forma efectiva.

Surco de la ojera

El surco de la ojera es la zona facial más delicada para trabajar. Se puede rellenar con materiales reabsorbibles blandos como el ácido hialurónico.

Esta mejora se obtiene de forma rápida , sencilla , sin apenas molestias y de forma efectiva.



Labios

Para el perfil del labio, el incremento de volumen labial y en arrugas peribucales se utilizan principalmente los ácidos hialurónicos. Las arrugas peribucales "código de barras" se puede completar el tratamiento con peelings químicos y láser semiablativo.

Esta mejora se obtiene de forma rápida, sencilla, sin apenas molestias y de forma efectiva.

Nariz

La remodelación de la nariz, la podemos realizar con acidos hialurónicos reticulados, modificando el perfil y mejorando y elevando la punta.

Esta mejora se obtiene de forma rápida, sencilla, sin apenas molestias y de forma efectiva.

Cuello y escote

En cuello y escote como implantes reabsorbibles se utilizan ácidos hialurónicos y el ácido poliláctico principalmente. Estas zonas mejoran mucho con peelings químicos, luz pulsada y laser semiablativo.

Esta mejora se obtiene de forma rápida, sencilla, sin apenas molestias y de forma efectiva.

Manos

El rejuvenecimiento de las manos con productos de relleno reabsorbibles como la hidroxiapatita calcica se consiguen resultados espectaculares, con sólo 1-2 sesiones.

Esta mejora se obtiene de forma rápida, sencilla, sin apenas molestias y de forma efectiva.



RELLENOS

Para trabajar estas zonas se aplican diferentes sustancias de relleno. Los implantes reabsorbibles son los más aconsejados, tienen menos efectos secundarios a largo plazo y se adaptan mejor a la evolución de los cambios cronológicos faciales.

Estos materiales son biocompatibles, el organismo los reconoce como propios, los reabsorbe y metaboliza lentamente.

Según la localización dentro de la cara, escote y manos, se usará un tipo de producto específico con el que realizar el tratamiento.

Entre los productos reabsorbibles biocompatibles que utilizamos en nuestra consulta desde hace años son:

- Los **ácidos hialurónicos** con diferentes densidades ó reticulaciones según la zona a tratar, se utiliza principalmente para dar volumen.
- La **hidroxiapatita cálcica** con efecto tensor ó incremento de volumen dependiendo de la dilución a la que trabajemos .
- El ácido poliláctico también como efecto tensor ó como incremento de volumen, Actúa estimulando el colágeno en la zona que se aplica, por ello el resultado puede ser más lento. Permite trabajar cara completa y cuello, además se puede trabajar escote, zona interna de muslos y brazos.

Técnica: con la incorporación de microcánulas con punta roma los hematomas son poco frecuentes.

La duración del tratamiento: 30-60 minutos aproximadamente.

Anestesia: si requiere normalmente es tópica (en pomada) e incremente en 30minutos la duración del tratamiento.

Nº de sesiones: varia en cada caso de 1 -3 máximo dependiendo del producto. Mantenimiento: se recomienda a los 6-12 meses una sesión.

No limita la vida diaria.

Se realiza todo el año.